Antibiotiques prescrits en milieux hospitaliers

β-LACTAMINES

Spécialités			Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
				Per os	IV/IM	Autre*			
Pénicillines	Pénicilline G	Benzylpénicilline (benzathine, procaïne, sodique)							
	Pénicilline A	Amoxicilline							
	Carboxypénicilline	Ticarcilline**							
	Uréidopénicilline	Pipéracilline							
	Pénicilline M	Oxacilline							
		Cloxacilline							
	Pénicilline + inhibiteur de β-lactamases	Amoxicilline- acide clavulanique							
		Ticarcilline-acide clavulanique**							
		Pipéracilline-tazobactam							
	Amidinopénicillines	Pivmecillinam							
	6-α-méthoxy-pénicilline	Témocilline							
Céphalosporines	1ère génération	Céfadroxil							
		Céfalexine							
		Céfazoline							
		Céfaclor							
	2e génération	Céfuroxime							
		Céfoxitine							
	3e génération	Cefpodoxime proxétil							
		Céfixime							
		Céftriaxone							
		Céfotaxime							
		Céftazidime							
	4e génération	Céfépime							
	5e génération	Ceftaroline							
		Ceftobiprole							
	Sidérophore	Céfidérocol							
	Céphalosporine + inhibiteur de β-lactamase	Ceftolozane-tazobactam							
		Ceftazidime-avibactam							
Monobactame	Monobactame	Aztréonam							
	Monobactame + inhibiteur de β-lactamase	Aztréonam-avibactam							
Carbapénèmes	Carbapénème	Imipénem-cilastatine							
		Méropénem							
		Ertapénème							
	Carbapénème + inhibiteur de β-lactamase	Imipénème-cilastatine – rélébactam							
		Méropénème - vaborbactam							

MACROLIDES ET APPARENTES

Spécialités			Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
				Per os	IV/IM	Autre*			
Macrolides	Macrolides 14 atomes	Erythromycine							
		Clarithromycine							
		Roxithromycine							
	Macrolides 15 atomes	Azithromycine							
	Macrolides 16 atomes	Spiramycine							
Lincosamides	Clindamycine								
Streptogramines	Pristinamycine						→ Macrolide		

FLUOROQUINOLONES

Spécialités		Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
			Per os	IV/IM	Autre*			
2e génération	Norfloxacine						< 3 jours	
	Ciprofloxacine							
	Ofloxacine					→ Cipro		
3e et 4e générations (antipneumococcique)	Lévofloxacine					→ Cipro	→ Cipro	
	Moxifloxacine					→ Cipro	→ Cipro	
5e génération	Délafloxacine							

© Clin92. 2026. Tous droits réservés.

CYCLINES

Spécialités		Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
			Per os	IV/IM	Autre*			
Tétracyclines	Doxycycline							
	Minocycline							
Glycylcycline	Tigécycline							

AUTRES CLASSES D'ANTIBIOTIQUES

Spécialités		Usage	Administration			Grossesse		Allaitement	Formulation pédiatrique
			Per os	IV/IM	Autre*				
Antifolates	Triméthoprime					1er trimestre	2e et 3e trimestre		
	Triméthoprime/sulfaméthoxazole								
Dérivé de l'acide phosphonique	Fosfomycine trométamol								
	Fosfomycine sodique								
Nitrofuranes	Nitrofurantoïne								
Fusidane	Acide fusidique								
Rifamycine	Rifampicine								
	Rifabutine								
Nitro-imidazolés	Métronidazole							<14 jours	
	Ornidazole					→ Metro		→ Metro	
	Tinidazole					→ Metro		→ Metro	
Aminosides	Gentamicine							< 5jours	
	Tobramycine							< 5jours	
	Amikacine							< 5jours	
Glycopeptides	Vancomycine								
	Téicoplanine					→ Vanco		→ Vanco	
Lipoglycopeptides	Dalbavancine								
	Oritavancine								
Polymyxine	Colistine								
Lipopeptide	Daptomycine								
Oxazolidinones	Linézolide								
	Tédizolide								
Macrocyclique	Fidaxomicine								

LEGENDE

Usage	Préférentiel	Restreint	Réservé
Administration	Disponible	Non disponible	
Grossesse	Autorisé	Vigilance - en absence d'alternative	Contre-indiqué
Allaitement	Autorisé	Vigilance - en absence d'alternative	Contre-indiqué
Formulation pédiatrique	Disponible	Non disponible	

* Autre : autres formulations (inhalation, auriculaire, oculaire…)
** fin de commercialisation
→ Metro : privilégier le métronidazole parmi les nitro-imidazolés lorsque le recours à cette classe est nécessaire
→ Vanco : privilégier la vancomycine parmi les glycopeptides lorsque le recours à cette classe est nécessaire
→ Cipro : privilégier la ciprofloxacine parmi les fluoroquinolones lorsque le recours à cette classe est nécessaire
< X jours : durée maximale recommandée de X jours

© Clin92. 2026. Tous droits réservés.