Antibiotiques prescrits en médecine de ville

β-LACTAMINES

Spécialités			Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
				Per os	IV/IM	Autre*			
Pénicillines	Pénicilline G	Benzathine-benzylpénicilline							
		Benzylpénicilline procaïne							
		Phénoxymethylpénicilline							
	Pénicilline A	Amoxicilline							
		Ampicilline							
	Pénicilline M	Oxacilline							
		Cloxaciline							
	Pénicillines + inhibiteur de β-lactamases	Amoxicilline - acide clavulanique							
	Amidinopénicillines	Pivmécillinam							
Céphalosporines	1re génération	Céfadroxil							
		Céfalexine							
	2e génération	Céfuroxime							
	3e génération	Céfpodoxime proxétil							
		Céfixime							
		Ceftriaxone							

MACROLIDES ET APPARENTES

Spécialités			Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
				Per os	IV/IM	Autre*			
Macrolides	Macrolides 14 atomes	Erythromycine							
		Clarithromycine							
		Roxithromycine							
	Macrolides 15 atomes	Azithromycine							
	Macrolides 16 atomes	Spiramycine							
Lincosamides	Clindamycine								
Streptogramines	Pristinamycine						→ Macrolide		

FLUOROQUINOLONES

Spécialités		Usage	Administration			Grossesse	Allaitement	Formulation pédiatrique
			Per os	IV/IM	Autre*			
Fluoroquinolones de 2e génération	Norfloxacine						< 3 jours	
	Ciprofloxacine							
	Ofloxacine					→ Cipro		
Fluoroquinolones des 3e et 4e générations (antipneumococcique)	Lévofloxacine					→ Cipro	→ Cipro	
	Moxifloxacine					→ Cipro	→ Cipro	

AUTRES CLASSES D'ANTIBIOTIQUES

Spécialités		Usage	Administration			Grossesse		Allaitement	Formulation pédiatrique
			Per os	IV/IM	Autre*				
Antifolates	Triméthoprime					1er trimestre	2e et 3e trimestre		
	Triméthoprime/sulfaméthoxazole								
Dérivés de l'acide phosphonique	Fosfomycine-trométamol								
Nitrofuranes	Nitrofurantoïne								
Fusidane	Acide fusidique								
Rifamycine	Rifampicine								
	Rifabutine								
Nitro-imidazolés	Métronidazole							< 14 jours	
	Ornidazole					→ Metro		→ Metro	
	Tinidazole					→ Metro		→ Metro	
Aminosides	Gentamicine							< 5 jours	
	Tobramycine							< 5 jours	
Cyclines	Tétracycline								
	Doxycycline								
	Minocycline								

LEGENDE			
Usage	Préférentiel	Restreint	
Administration	Disponible	Non disponible	
Grossesse	Autorisé	Vigilance - en absence d'alternative	Contre-indiqué
Allaitement	Autorisé	Vigilance - en absence d'alternative	Contre-indiqué
Formulation pédiatrique	Disponible	Non disponible	

* Autre : autres formulations (inhalation, auriculaire, oculaire)
→ Metro : privilégier le métronidazole parmi les nitro-imidazolés lorsque le recours à cette classe est nécessaire
→ Macrolide : privilégier un macrolide lorsque le recours à cette classe est nécessaire
→ Cipro : privilégier la ciprofloxacine parmi les fluoroquinolones lorsque le recours à cette classe est nécessaire
< X jours : durée maximale recommandée de X jours

© Clin92. 2026. Tous droits réservés.