

# Hantavirus

Rédaction : Eric Farfour

Avril 2026



- Virus à ARN simple brin, enveloppé, segmenté
- + de 30 espèces décrites



- Infecte les rongeurs
- Chaque espèce de rongeur héberge un type spécifique de hantavirus
- Ne provoque pas de maladie chez l'animal
- Excrétion dans les urine, les excréments et la salive



- Contamination par
  - Inhalation de poussières contaminées
  - Contact direct avec des surfaces contaminées
  - Morsure ou griffure par un rongeur infecté
  - Ingestion d'aliments contaminés
- Transmission interhumaine rare et par voie respiratoire décrite uniquement avec la souche Andes



- Incubation : 4 jours à 42 jours
- Souches d'Europe et d'Asie : formes peu symptomatiques à fièvres hémorragiques avec syndrome rénal
  - Pas de transmission interhumaine
  - Taux de mortalité 0,5 % à 15 % selon les espèces
- Souches d'Amérique : atteinte respiratoire sévère
  - Possible transmission interhumaine respiratoire en cas de contact rapproché pour la souche Andes
  - Taux de mortalité ≈ 20 à 40 %



- Pas de traitement spécifique



- Éviter le contact avec les rongeurs et leurs excréments
- Port de masque et de gants en cas de risque