

Taxonomie des champignons filamenteux

Rédaction : Dr Eric Farfour

Avril 2026



Mucorales

<i>Actinomucor elegans</i>	—
<i>Apophysomyces elegans</i>	—
<i>Cunninghamella bertholletiae</i>	—
<i>Lichtheimia corymbifera</i>	→ <i>Absidia corymbifera</i>
<i>Mucor circinelloides</i>	—
<i>Rhizomucor pusillus</i>	—
<i>Rhizopus arrhizus</i>	→ <i>Rhizopus oryzae</i>
<i>Rhizopus microsporus</i>	—
<i>Saksenaea vasiformis</i>	—
<i>Syncephalastrum racemosum</i>	—

Scedosporium et apparentés


<i>Lomentospora prolificans</i>	→ <i>Seedosporium prolificans</i>
<i>Scedosporium boydii</i>	→ <i>Pseudallescheria boydii</i>
<i>Seedosporium apiospermum</i>	→ <i>Pseudallescheria apiospermum</i>

Champignons dimorphiques

<i>Blastomyces dermatitidis</i>	→ <i>Ajellomyces dermatitidis</i>
<i>Blastomyces gilchristii</i>	—
<i>Coccidioides immitis</i>	—
<i>Coccidioides posadasii</i>	→ <i>Coccidioides immitis</i>
<i>Emergomyces africanus</i>	→ <i>Emmonsia africanus</i>
<i>Emergomyces pasteurianus</i>	→ <i>Emmonsia pasteuriana</i>
<i>Histoplasma capsulatum</i>	—
<i>Histoplasma duboisii</i>	→ <i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>duboisii</i>
<i>Paracoccidioides rasilensis</i>	—
<i>Sporothrix brasiliensis</i>	—
<i>Sporothrix globosa</i>	→ <i>Sporothrix schenckii</i>
<i>Sporothrix schenckii</i>	→ <i>Sporothrix schenckii</i>
<i>Talaromyces marneffeii</i>	→ <i>Penicillium marneffeii</i>

Aspergillus

<i>Aspergillus flavus</i>	—
<i>Aspergillus fumigatus</i>	—
<i>Aspergillus niger</i>	—
<i>Aspergillus terreus</i>	—



Agents d'eumycétome

<i>Madurella grisea</i>	—
<i>Madurella mycetomatis</i>	—

Les anciennes dénominations apparaissent à gauche et les nouvelles à droite

— : pas de modification

Dermatophytes

<i>Arthroderma benhamiae</i>	→ <i>Trichophyton benhamiae</i>
<i>Epidermophyton floccosum</i>	—
<i>Microsporum audouinii</i>	—
<i>Microsporum canis</i>	—
<i>Nannizzia gypsea</i>	→ <i>Microsporum gypseum</i>
<i>Trichophyton interdigitale</i>	→ <i>Trichophyton mentagrophytes</i>
<i>Trichophyton rubrum</i>	—
<i>Trichophyton tonsurans</i>	—
<i>Trichophyton verrucosum</i>	—
<i>Trichophyton violaceum</i>	—

Phaeohyphomycètes

<i>Alternaria alternata</i>	—
<i>Bipolaris spicifera</i>	—
<i>Cladophialophora bantiana</i>	→ <i>Xylohypha bantiana</i>
<i>Cladosporium cladosporioides</i>	—
<i>Curvularia lunata</i>	—
<i>Exophiala dermatitidis</i>	→ <i>Wangiella dermatitidis</i>
<i>Exserohilum rostratum</i>	—
<i>Fonsecaea monophora</i>	—
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>	→ <i>Hormodendrum pedrosoi</i>
<i>Neoscytalidium dimidiatum</i>	→ <i>Scytalidium dimidiatum</i>
<i>Phialophora verrucosa</i>	—

Hyalohyphomycètes

<i>Acremonium strictum</i>	—
<i>Fusarium oxysporum</i>	→ <i>Fusarium oxysporum</i>
<i>Fusarium solani</i>	→ <i>Fusarium solani</i>
<i>Paecilomyces variotii</i>	—
<i>Purpureocillium lilacinum</i>	→ <i>Paecilomyces lilacinus</i>
<i>Rasamsonia argillacea</i>	→ <i>Geosmithia argillacea</i>
<i>Sarocladium kiliense</i>	→ <i>Acremonium kiliense</i>
<i>Scopulariopsis brevicaulis</i>	—