

Vaccination des plus de 65 ans

Rédaction : Eric Farfour

Septembre 2025



6 Vaccins recommandés

- Grippe saisonnière
- COVID-19
- VRS
- Pneumocoque
- DTPCa*
- Zona

*DTPCa : Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche



Principales maladies prévenues

Pathogène	Principales manifestations				Mode de transmission		
COVID-19 ^a		✓			✓		
Grippe ^a		✓			✓		
VRS ^a		✓			✓		
Pneumocoque	✓	✓			✓		
Diphtérie	✓	✓	✓		✓		
Tétanos	✓						✓
Poliomyélite	✓					✓	
Coqueluche ^b		✓			✓		
Zona	✓			✓			

^a La vaccination contre la COVID-19, la grippe et le VRS diminuent le risque de survenu d'événements cardiovasculaires au cours de l'infection par ces virus

^b L'objectif principal de la vaccination contre la coqueluche est de limiter le risque de transmission aux nourrissons de moins de 6 mois et aux femmes enceintes



En pratique

Vaccins	Qui ?	Quand ?
Grippe	• Personnes âgées de 65 ans et plus	• Une dose, à renouveler tous les ans à l'automne
COVID-19	• Personnes âgées de 65 ans et plus	• Une dose, à renouveler tous les ans à l'automne • Une dose supplémentaire est recommandée au printemps pour : ○ Les personnes âgées de 80 ans et plus, ○ Les résidents d'EHPAD et USLD, ○ Les personnes immunodéprimées.
VRS	• Personnes âgées de 75 ans et plus • Personnes âgées de 65 ans et plus ayant des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques	• Une dose • Pas de rappel recommandé à ce jour
Pneumocoque	• Personnes âgées de 65 ans et plus	• Une dose • Pas de rappel recommandé à ce jour
DTPCa*	• Personnes âgées de 65 ans et plus • Pour la coqueluche : personnes non vaccinées au cours des cinq dernières années et ayant dans leur entourage une femme enceinte ou un nourrisson de moins de 6 mois	• Une dose de rappel à 65 ans puis tous les 10 ans
Zona	• Personnes âgées de 65 ans et plus	• Deux doses à deux mois d'intervalle • Pas de rappel recommandé à ce jour